

Антигельминтик широкого спектра действия для дегельминтизации сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птицы

СОСТАВ: 1 таблетка АЛЬБЕНА содержит 360 мг альбендазола и вспомогательные компоненты.

НАЗНАЧЕНИЕ: АЛЬБЕН применяют для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, пушных зверей и птицы при следующих заболеваниях:

- нематодозы: легочные (диктиокаулез, протостронгилез, мюллерииоз, цистокаулез, неоостронгилез, метаостронгилез); желудочно-кишечные (гемонхоз, остертагиоз, трихостронгилез, нематодироз, буностомоз, гиостронгилез, стронгилоидоз, аскаридоз, параскариоз, токсокароз, токсаскариоз, анкилостомоз, унцинариоз, аскаридиоз, гетеракидоз, хабертиоз, коопериоз, эзофагостомоз, трихоцефалез, оксиуроз);
- цестодозы (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз);
- трематодозы (фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматозы).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: АЛЬБЕН таблетки назначают внутрь, без предварительной голодной диеты, индивидуально или групповым способом (предварительно измельчив), в смеси с концентрированными кормами сельскохозяйственным животным - однократно, пушным зверям и птице - двукратно.

- **КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ** - 1 таблетка на 50 кг массы животного. При трематодозах и остертагиозе дозу увеличивают и назначают 1 таблетку на 35 кг массы животного;
- **ОВЦАМ И КОЗАМ** - 1 таблетка на 70 кг массы животного. При трематодозах и протостронгилидозах дозу увеличивают и назначают 1 таблетку на 45 кг массы животного;
- **СВИНЬЯМ** - 1 таблетка на 35 кг массы животного;
- **ЛОШАДЯМ** - 1 таблетка на 50 кг массы животного;
- **ПУШНЫМ ЗВЕРЯМ** - 1 таблетка на 25 кг массы животного 1 раз в день два дня подряд;
- **ПТИЦЕ** - 1 таблетка (предварительно тщательно измельченная) на 35 кг массы птицы 1 раз в день два дня подряд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не рекомендуется применять при остром фасциолезе, во время случного периода, овцам в первую половину, а самкам других видов животных - в первую треть беременности, а также больным инфекционными болезнями и истощенным животным. Побочных явлений и осложнений при применении препарата согласно инструкции не наблюдается.

Убой на мясо крупного рогатого скота, овец и коз разрешается не ранее, чем через 14 дней; свиней, лошадей и птицы - не ранее, чем через 7 дней после дегельминтизации. Молоко может быть использовано в пищевых целях не ранее, чем через 4 дня после дегельминтизации. У кур препарат выделяется с яйцом в течение 4-х дней. Мясо, вынужденно убитых животных, молоко и яйцо, полученные до истечения указанных сроков, могут быть использованы на корм плотоядным животным.