

Заболевание птицы приводит к резкому снижению продуктивности, а во многих случаях к 100%-ной гибели.

Из инфекционных заболеваний чаще встречаются ньюкаслская болезнь, грипп, болезнь Марека, болезнь Гамборо, лейкоз, инфекционный ларинготрахеит, оспа, аспергиллез, респираторный микоплазмоз, туберкулез, пуллороз — тиф, сальмонеллез, пастереллез, эймериоз, гельминтозные заболевания, а также поражения наружными паразитами (клещи, клопы, пухопероеды и др.).

Из незаразных заболеваний возможны авитаминозы, отравления, каннибализм (расклев), гипертермия (перегрев), бронхопневмония, гастроэнтерит, атония зоба, диспепсия, клоацит (воспаление слизистой оболочки клоаки), воспаление яйцевода, желточный перитонит и др.

При заболевании у птицы повышается температура тела до 43-44 °С, отмечаются угнетение, сонливость; птица сидит с опущенными крыльями, нахохлившись, глаза закрыты. Для профилактики используют аэрозоль педокс-50 и др. Обработку инсектицидами следует через 6-7 дней повторить.

Для борьбы с эктопаразитами применяют зольные ванны.

После дезинфекции и дезинсекции кормушки и поилки надо хорошо промыть раствором кальцинированной соды.

Дез. средства и инсектициды можно распылять при помощи садовых опрыскивателей, но при этом необходимо соблюдать меры предосторожности: работать в резиновых перчатках, сапогах, с марлевой повязкой на лице, в очках, фартуке и т. п.

После обработки в помещении надо закрыть окна, двери, лазы на 2-3 часа, а затем хорошо проветрить.

В последующем такие обработки птичника надо проводить ежегодно.

Помет и подстилку надо складывать в бурты или ямы для биотермического обеззараживания. Если в помете мало подстилки, то к нему надо добавить солому в соотношении 4:1 и увлажнить водой. Сверху помет укрывают слоем земли, поли-этиленовой пленкой и оставляют на 2-3 месяца. В течение это-го времени произойдет самосогревание (горение) помета и болезнетвор-ные микробы погибнут.

Если птица содержится на глубокой подстилке, то перед тем, как настелить слой соломы или опилок, пол нужно засыпать гашеной известью из расчета 0,5 кг на 1 м² пола.

Чтобы избежать перезаражения птицы, молодняк надо вы-ращивать изолированно от взрослого стада.

При гельминтозах (аскаридоз, гетеракидез и др.) можно при-менять пиперазин с фенотиазином из расчета 0,25 г пиперазина и 0,5 г фенотиазина на 1 кг живой массы птицы. Пиперазин растворяют в теплой воде и тщательно перемешивают с кор-мом, фенотиазин смешивают с кормом в сухом виде. Дачу пре-паратов необходимо повторять каждые 60-70 дней до полного оздоровления стада от гельминтов.

Давать лекарство лучше во второй половине дня, ближе к вечеру. Птица, получившая препараты, будет ночевать на на-сесте, а помет, содержащий заразное начало, окажется на полу. Утром его надо убрать и сложить для биотермического обезза-раживания.

Можно давать и другие антигельминтики: нилверм (тетрамизол), фенбендазол (панакур,

фенкур), фебантел (рептал) и др. Применять названные препараты надо строго по инструкции, **а лучше посоветоваться с ветеринарным специалистом.**

Переносчиками возбудителей инфекционных болезней могут быть мыши и крысы, поэтому необходимо принять все меры по уничтожению этих грызунов.

Против большинства инфекционных заболеваний имеются хорошие вакцины. В зависимости от эпизоотической ситуации вакцинацию (прививки) против этих болезней должны делать ветеринарные специалисты.

Основой профилактики незаразных болезней также является строгое соблюдение условий содержания и кормления.

В первые, часы жизни птицы необходимо контролировать температурно-влажностный режим, освещение и другие параметры микроклимата.

Ни в коем случае нельзя давать испорченный корм (заплесневевший, почерневший, с затхлым запахом и т. д.).

Избыточное содержание соли в рационе также может привести к заболеванию и даже смерти птицы. Соли в рационе не должно быть больше 0,2-0,5%.

При нарушении норм и условий кормления возникают воспаление кишечника, брюшины, перерождение печени, нефриты, авитаминозы и др.

В случае появления поноса надо немедленно заменить корма, ввести в рацион свежий творог, кефир или простоквашу.

Несвежую воду срочно заменить. В воду добавить марганцовокислый калий.

Для профилактики кишечных расстройств воду с марганцовокислым калием птице надо давать еженедельно по утрам. Примерно через полчаса ее надо вылить из поилок, а в них налить чистую воду. Кроме того, в воду можно добавлять несколько капель йода.

Для профилактики авитаминозов надо позаботиться о витаминных кормах или же давать специальные витаминные препараты и в первую очередь витамины А, D₃, Е, группы В.

Настольная книга фермера. А.Снегов. 2009г.